

いたのかも判らない。ハイコモチシダが九州から飛んで伊豆半島に現われる例と共に植物地理学上で興味ある問題であると思う。地史上の暖期に於ける遺存物の適例として報告する。

〇オオイトスゲの一新品 (桧山庫三) Kōzō HIYAMA: A new variety of *Carex sachalinensis* Fr. Schm.

オオイトスゲは関東では割合に安定した型をとつていのように見えるが、武蔵国日原村倉沢の山中には果胞に微刺状の粗毛を疎に散生するものがある。果胞の脈数も幾分少ないので、これまで未記録の型と認めてクラサワスゲ (*Carex sachalinensis* var. *musashiensis* Hiyama) の名で呼ぶことにしたい。このスゲは1948年の採集であるが、1949年にも奥多摩(武州古里村)大丹波川沿いの路傍で本変種かと思われるものを採つたことがあるがその標本を失つたので確認できない。

Carex sachalinensis Fr. Schm., Reis. Amurl. u. Ins. Sachal. 194 (1868).

var. *musashiensis* Hiyama, var. nov.

Arcte affinis *C. sachalinensis* var. *alterniflorae* (Fr., pro sp.) Ohwi, sed utriculi ± paucinervi pili setulosi parce pubescentes

Hab. Hondo: in regione montana Kurasowa, Nipparamura, prov. Musashi. (Hiyama, Mai. 30, 1948, typus—in Herb. Nation. Sci. Mus., Tokyo)

正 誤 Errata Vol. 29, No. 4. April 1954

頁 (page)	行 (line)	誤 (for)	正 (read)
98	17	隆走部	隆起部
107	7 from bottom	Plate IV	Plate VI
109	4 from bottom	defferent	different
110	7	Kiyataka	Kiyotaka
122	8 from bottom	subglobossa	subglobosa
123	4 from bottom	branchelets	branchlets
124	19	<i>H. chinensis</i>	<i>H. chinensis</i>
125	15	<i>Hydrangia</i>	<i>Hydrangea</i>
125	19	<i>H. yakumensis</i>	<i>H. yakusimensis</i>
125	5 from bottom	Quartely	Quarterly
127	12	explane	explain
127	8 from bottom	may	many
128	1	illnstratae	Illustratae